

AGENTADOX 10/5 – Poudre Hydrosoluble Antibiotique



Composition:

Par gramme de poudre, 100mg gentamine sulphate et 50mg doxycycline hyclate.

Indications:

Gentamicine est un antibiotique appartenant au groupe des aminoglycosides. C'est un actif bacteriologique contre les bactéries Gram. positives et les Gram. négatives (dont: Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., E. coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococci). De plus c'est un actif contre Campylobacter fetus subsp., jejuni et Treponema hyodysenteriae. La gentamicine peut être active contre les bactéries résistantes aux autres antibiotiques aminoglycosides (comme neomycine, streptomycine, kanamycine). La doxycycline est un dérivé de la tetracycline, avec une action bactériologique contre un grand nombre de bactéries Gram positifs et Gram négatifs (comme Staphylococci spp., Haemophilus influenza, E. coli, Corynebacteria, Bacillus anthracis, quelques Clostridia spp., Actinomyces spp., Brucella spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. et Yersinia spp.). Elle agit aussi contre Mycoplasma spp., Rickettsiae et Chlamydia spp. L'absorption après l'administration orale de doxycycline sera bien et le niveau thérapeutique sera atteint rapidement et résistera pendant une longue période. La doxycycline a une grande affinité avec les poumons donc elle est particulièrement recommandée pour les infections respiratoires. Indiqué en cas d'infections causées par les micro-organismes sensibles à la gentamicine et/ou à la doxycycline. Agentadox 10/5 est indiqué surtout pour les infections gastro-intestinales chez les veaux et volailles et les infections respiratoires chez les porcins, volailles et veaux.

Contre-Indications:

L'hypersensibilité à l'aminoglycosides et/ou à la tetracyclines, dysfonctionnements rénaux, auditifs, visuels et du foie, la combinaison avec des médicaments potentiellement néphrotoxiques ou des paralysants musculaires.

Effets Secondaires:

Dégâts rénaux et/ou ototoxicité, réactions d'hypersensibilité comme des dérangements gastro-intestinaux ou des changements de flore intestinale.

Dosage et Administration : Pour usage dans l'eau potable ou la nourriture.

Utiliser l'eau médicinée dans les 24 heures après préparation.

Volailles: 100g par 150 litres d'eau de boisson pendant 3-5 jours.

Veaux: 100g par veaux de 50 kg de poids vif pendant 4-6 jours.

Porcins: 100 g par 100 litres d'eau de boisson pendant 4-6 jours.

Abstention: 18 jours pour oeufs, 8 jours pour viande, 3 jours pour lait.

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

12 x 10 x 100 gm sachet dans 1 carton.

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT