

AGRACOX – Poudre Hydrosoluble Anticoccidienne



Composition:

Chaque kilo de poudre contient :

Sulfadimerazine: 200 g

Sulfadiazine sodium: 25 g

Pyrimethamine hcl: 25 g

Furaltadone hcl: 100 g

Vitamin A: 15.000.000 IU

Vitamin K3: 5 g

Support soluble: q.s. ad 1 kg

Indications:

Volaille: prévention et traitement de la coccidiose intestinale, diarrhée, entérites, typhose aviaire et Pullorose en poulets de chair, poulettes, pondeuses et reproducteurs.

Porcelets: prévention et traitement de diarrhée et entérites.

Dosage et Administration :

Prévention: 100 grammes par 200 litres d'eau potable pendant 3 jours de suite

Traitement: 100 grammes par 100 litres d'eau potable pendant 3 jours de suite.

Pendant le traitement administrer seulement de l'eau médicinée.

Recommandations et Avertissement:

L'eau potable médicinée doit être consommée dans les 24 heures après préparation.

Abstention: Oeufs et viande: 10 jours.

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

12 x 10 x 100 gm sachet dans 1 carton.

12 x 1 kg pot dans 1 carton.

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT