



GENTAJECT 10 % – Solution Injectable

Composition:

Chaque ml contient 100 mg de gentamicin base (comme gentamicin sulphate).

Indications:

La gentamicine est un antibiotique appartenant au groupe des aminoglycosides. C'est un actif bacteriologique contre les bactéries Gram positives et les Gram négatives (dont: Rhodococcus equi, Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Actinobacillus spp., Campylobacter fetus subsp. Jejuni et staphylococci). De plus c'est un actif contre Pseudomonas spp., Salmonella spp., Klebsiella pneumoniae, E. coli, Actinomyces pyogenes, Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., et Treponema hyodysenteriae. L'antibiotique est aussi actif contre les mycoplasmas. La gentamicine peut être active contre les bactéries résistantes aux autres antibiotiques aminoglycosides (comme neomycine, streptomycine, kanamycine).

Indiqué en cas d'infections causées par les micro-organismes susceptibles à la gentamicine, comme l'apparition d'infections urogénitales, respiratoires, de peau, de l'utérus, des tissus et gastro-intestinales chez les poulains, chevaux, porcs, moutons et chèvres.

Contre-Indications:

Hypersensitivité aux antibiotiques aminoglycosides, dysfonctionnements rénal, dysfonctionnements de la vue, de l'ouïe, combinaisons avec des nephrotoxiques potentiels ou des médicaments paralysants les muscles.

Seulement une demi dose doit être donné aux animaux avec des fonctions rénales réduites.

Effets Secondaires:

Dégats rénaux, avec des fonctions vestibular étant endommagées, peuvent apparaitre quand il y a de fortes doses et durant de longues périodes; rarement, des paralysies respiratoires dues à des blocages neuromusculaires (quand il y a de très fortes doses) peuvent apparaitre.

Dosage et Administration :

Pour les administrations intramusculaires et intravéneuses:

Chevaux, veaux, poulains, bétail, porcins, ovins, caprins: 2 ml par 50 kg de poids vif.

Porcelets, chiens, chats: 0.5 ml par 5 kg de poids vif.

Ces doses sont de préférence données 2x le premier jour, et après 1x par jour durant 2 jours.

Pour l'application intra-utérine:

Chevaux (seulement durant oestrus):

metrites sérieuses, 5 ml par jour pendant 3-5 jours.

metrites chroniques, 20-25 ml par jour durant 3-5 jours.

Bovins: 2 ml 1x dilués avec 16 ml de solution saline isotonique (0.9%).

Abstention: Viande: 7 jours / Lait: 3 jours.

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

4 x 12 = 48 x 100 ml flacons dans 1 carton.

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT